



فیزیک ۲

آموزش و تست
بازدهم

پر از تست های دوست داشتنی

• نصرالله افضل • مصطفی کیانی • کاظم اسکندری

• مدیر و ناظر علمی گروه فیزیک: نصرالله افضل



مهروماه

مقدمه

در یادگیری و تسلط بر مفاهیم درسی و آموزشی، داشتن پشتکار و تلاش منظم، اگر مهم‌ترین عامل موفقیت نباشد، اما مهم‌ترین است که این ویژگی‌ها مهم‌ترین عامل موفقیت نیستند. بر این اساس، مؤلفان این کتاب کوشیده‌اند تست‌هایی متنوع از ساده تا دشوار، و در برگیرنده همه مفاهیم و نکته‌های درسی را برای شما دانش‌آموزان سخت‌کوش، منظم و دقیق فراهم کنند تا زمینه‌ساز موفقیت شما در کنکور سراسری باشد.

برخی از ویژگی‌های این کتاب

- ۱ ساختار منطقی آموزشی و متناسب با آخرین تغییرات کتاب درسی به طوری که شما می‌توانید پس از تدریس دییر محترم و یادگیری مفاهیم هر بخش، تست‌های مربوط به جلسه تدریس را پاسخ دهید.
- ۲ درست‌نامه‌های جامع و روان که به منظور درک عمیق‌تر مفاهیم برای شما نگاشته شده است.
- ۳ سوال‌های کنکور سراسری و تست‌های تالیفی شبیه‌سازی شده با کنکور که حاصل خرد جمعی مؤلفان است.
- ۴ تست‌ها تیپ‌بندی شده‌اند و در هر بخش بر اساس روند آموزشی و از تست‌های ساده به دشوار چیده شده‌اند تا یادگیری برایتان لذت‌بخش و آسان‌تر باشد و قوت قلب بیشتری بیابد.
- ۵ پوشه‌ش صدرصدی و نعل به نعل تمرین‌ها، فعالیت‌ها، مسئله‌ها و تصویرهای کتاب درسی که در قالب تست آورده شده‌اند.
- ۶ پاسخ‌های ابرتشریحی مفهومی همراه با ارائه روش‌های تستی متنوع
- ۷ راهبردهای آموزشی همراه با آخرین فوت‌وفن‌های مورد نیاز برای پاسخ سریع تست‌ها
- ۸ تذکرها و یادآوری‌های بسیار مفید در پاسخ‌نامه که تکمیل‌کننده آموزش مفاهیم درس است.
- ۹ آزمون استاندارد در پایان هر فصل برای محک زدن و اطمینان از تلاش و زحمتی که به کار برداشت.
- ۱۰ امکان استفاده از اینیمیشن‌ها و آزمایش‌های جذاب و مفهومی مرتبط با درست‌نامه که به شما در یادگیری و تسلط مفاهیم کمک می‌کند.

راهنمای استفاده از کتاب

مرحله اول: پیش از شروع در هر بخش، باید مطمئن باشید که مفاهیم درسی را که دییر گرامی تدریس کرده‌اند به خوبی یاد گرفته‌اید و تمرینات کتاب درسی و مثال‌های آن را کار کرده باشید. توصیه من کنیم که در این مرحله، کتاب کار فیزیک ۲ مهروماه را کار کنید.

مرحله دوم: درست‌نامه‌ای را که در بخش مورد نظر آورده‌ایم به دقت مطالعه و خلاصه‌نویسی کنید.

مرحله سوم: تست‌های شاخص بخش، تست‌هایی که با علامت مشخص شده‌اند را پاسخ دهید و حتماً پاسخ‌نامه تشریحی را هم مطالعه کنید. راهبردهایی را که در پاسخ‌نامه آورده ایم خلاصه نویسی کنید. در این مرحله، مفاهیم این بخش در ذهنتان تثبیت می‌شود.

مرحله چهارم: دیگر تست‌های بخش را به ترتیب (سعی کنید ترتیب را رعایت کنید) پاسخ دهید. کوشیده‌ایم ترتیب تست‌ها از ساده به دشوار باشد.

مرحله پنجم: پاسخ تشریحی تست‌های انتخاب کرد که مفاهیم درسی مسلط شوید. (اگرچه گزینه درست را انتخاب کرده باشید،) بخشی از یادگیری و تسلط شما با مطالعه پاسخ‌نامه انجام می‌شود.

مرحله ششم: در پایان هر فصل آزمون را پاسخ دهید.

و اما قدردانی...

- در پایان وظیفه خود من دامن از همه همکاران مهروماهی عزیز که برای به ثمر رساندن این کتاب، مولفین را باری نمودند سپاسگزاری کنم:
- جناب آقای احمد اختیاری، مدیر فرزانه انتشارات مهروماه که از هرگونه راهنمایی و حمایت ما فروگذاری نکردند؛
 - جناب آقای استاد محمدحسین انوشه، مدیر شورای تالیف که از تجربه غنی تالیف و مدیریت خود، ما را بهرهمند ساختند؛
 - سرکار خانم زهرا خوشنود، مدیر اجرایی دروس اختصاصی و همکارانشان که زحمت فراوان در پیشبردمراحل مختلف کتاب کشیده اند؛
 - همکاران گروه هنری که با طراحی زیبای جلد و صفحه های داخل کتاب بر ارزش آن افزودند؛
 - سرکار خانم سمیه جباری، مدیر تولید و همکارانشان که با پیگیری و تلاش ایشان کتاب به مرحله چاپ رسید؛
 - سرکار خانم رویا طبسی که کتاب را با دقت هرچه تمامتر صفحه آرایی کردند و آراستند؛
 - سرکار خانم الناز رضوانی و آقای محسن کامران پور حروف نگاران، خانمها فرشته شاهبیک و منصوره محمدی رسام شکل های کتاب؛
 - از خانم فرزانه قنبری، مدیر روابط عمومی، آقای امیر انوشه مدیر سایت و همکارانشان که معرفی کتاب و رساندن آن به شمارا به عهده دارند و از آقای ذوالفقار یهودی که آسایش همکاران را در انتشارات فراهم کردند، بسیار سپاسگزارم.

مدیر و ناظر علمی گروه فیزیک
نصرالله افضل

فهرست

٩

فصل اول الکتریسیتیٰ ساکن

۱۵۱

فصل دوم جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

۲۷۵

فصل سوم مغناطیس

۳۶۱

فصل چهارم القای الکترومغناطیس و جریان متناوب

اثر دیالکتریک بر میدان الکتریکی

برخی دیالکتریک‌ها از مولکول‌های غیرقطبی تشکیل می‌شوند مانند متان و بنزن و برخی از مولکول‌های قطبی مانند آب، آمونیاک و کلریدریک اسید ساخته می‌شوند. در این بحث رفتار این دیالکتریک‌ها را در میدان الکتریکی بررسی می‌کنیم:

- ۱) **دیالکتریک غیرقطبی در میدان الکتریکی:** در این حالت به سبب اثر میدان بر ابرالکترونی مولکول‌های دیالکتریک، ابرالکترونی خلاف جهت میدان الکتریکی جایه‌جا می‌شود و مرکز اثر بارهای مثبت و منفی مولکول (atom) از هم جدا می‌شوند و در یک طرف مولکول آثار بار منفی و در طرف دیگر آثار بار مثبت ظاهر شده و به اصطلاح می‌گویند مولکول دو قطبیده شده است.



در حضور میدان الکتریکی، مرکز بارهای مثبت و منفی از هم جدا می‌شوند و ابرالکترونی در خلاف جهت میدان جایه‌جا می‌شود.

در نبود میدان الکتریکی، مرکز بارهای مثبت و منفی به هم منطبق‌اند.

این قطبیده شدن هر مولکول، میدان الکتریکی خلاف جهت میدان الکتریکی خارجی پدید می‌آورد و ما آن را \bar{E}' می‌نامیم و این پدیده سبب می‌شود میدان الکتریکی خارجی ضعیف شود.
 $E_T = E - E'$

نکته


وجود دیالکتریک در میدان الکتریکی، سبب ضعیف شدن میدان می‌شود.

۷۱

۷۲

۷۳

- ۲) **اثر دیالکتریک با مولکول‌های قطبی بر میدان الکتریکی:** هر مولکول از این نوع دیالکتریک‌ها قطبیده هستند. اما در حالت عادی هر کدام جهت‌گیری کاتورهای دارند و در مجموع ماده دیالکتریک آثاری از میدان الکتریکی از خود ندارد. اما با قرار گرفتن دیالکتریک در میدان الکتریکی خارجی، آرایش مولکول‌ها (دوقطبی‌ها) به گونه‌ای تغییر می‌کند که سر مثبت آن‌ها هم جهت میدان و سر منفی آن‌ها خلاف جهت میدان می‌چرخد و به گونه‌ای آرایش می‌یابند که میدان الکتریکی هر مولکول (یعنی \bar{E}') تقریباً خلاف جهت میدان خارجی (\bar{E}) قرار می‌گیرد. و در مجموع میدان الکتریکی مولکولها یعنی E' از میدان خارجی E ، می‌کاهد.
 $E_T = E - E'$



در تبود میدان الکتریکی، مولکول‌های سمت‌گیری مولکول‌های دوقطبی خارجی همراهی دارند.

در حضور میدان الکتریکی، مولکول‌های قطبی می‌کوشند خود را در جهت میدان الکتریکی خارجی همراهی دارند.

نکته

بنابراین اگر دیالکتریک با مولکول‌های قطبیده هم در میدان الکتریکی قرار گیرد، میدان الکتریکی خارجی درون دیالکتریک ضعیف می‌شود.

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که وجود دیالکتریک چگونه بر ظرفیت حازن اثر می‌گذارد؟

برای بررسی و پاسخ به این سؤال دو حالت در نظر می‌گیریم:

حالت اول: حازن به مولد متصل است:

در این حالت ولتاژ خازن برابر ولتاژ مولد و مقداری ثابت است. اگر دیالکتریک درون خازن ببریم، بنا به رابطه $E = \frac{V}{d}$ چون در لحظه ورود دیالکتریک، میدان الکتریکی خازن باید کم شود و در نتیجه ولتاژ خازن کم می‌شود و چون خازن به مولد متصل است مولد در خازن بار بیشتری القا و جایه‌جا می‌کند تا ولتاژ خازن دوباره برابر ولتاژ مولد شود و بنابر رابطه $V = CV$ چون C زیاد شده است می‌توان نتیجه گرفت ظرفیت خازن (C) افزایش یافته است.

حالت دوم: خازن بار الکتریکی دارد و از مولد جدا است: در این حالت بار خازن ثابت است. (زیرا با وسیله دیگری مانند باتری یا خازن دیگر در ارتباط نیست و نمی‌تواند با آن‌ها بار مبادله کند) با ورود دی الکتریک در خازن، (کاملاً فضای خازن پرشود) میدان الکتریکی آن ضعیف می‌شود و بنابر رابطه $E = \frac{V}{d}$ ، می‌توان دریافت خازن V کم می‌شود و از رابطه $C = \frac{q}{V}$ (ثابت) V کم شده و q ثابت مانده، می‌توان نتیجه گرفت، ظرفیت خازن زیاد شده است.

بنابراین: «ورود دی الکتریک به خازن سبب افزایش ظرفیت خازن می‌شود»

ظرفیت خازن تخت با دی الکتریک

اگر فرض کنیم ظرفیت خازن که بین دو صفحه‌اش خلا (یا هوا) است، برابر $\frac{A}{d} = C$ باشد، با قرار دادن دی الکتریک در خازن ظرفیت آن κ^2 برابر می‌شود و می‌توان ظرفیت خازن با دی الکتریک (C) را از رابطه مقابله به دست آورد: $C = \kappa C_0 \Rightarrow C = \kappa \frac{A}{d}$

در این رابطه κ را ثابت دی الکتریک می‌نامند.

واضح است که $\kappa \geq 1$ است و یکای آن (یک) است. (یکان ندارد)

ثابت دی الکتریک به جنس ماده دی الکتریک بستگی دارد و به ابعاد آن بستگی ندارد.

ثابت دی الکتریک برخی عایق‌ها در دمای 20°C

| ثابت دی الکتریک | ماده دی الکتریک | ثابت دی الکتریک | ماده دی الکتریک |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| $3/5$ | کاغذ | $1/10000$ | هوای atm |
| $4/3$ | کوارتز | $2/1$ | نفلون |
| 5 | شیشه پیرکس | $2/2$ | پارافین |
| 7 | میکا | $2/6$ | پلی استرن |
| 8 | آب خالص | $3/1$ | میلار |
| 310 | تیتانیم استرانسیوم | $3/4$ | بی‌وی‌سی |

مثال: ظرفیت خازن تخت با دی الکتریک هوا C و به یک باتری با ولتاژ V وصل است. اگر فاصله دو صفحه آن را سه برابر و ماده‌ای با ثابت دی الکتریک 5 (شیشه پیرکس) را بین دو صفحه آن قرار دهیم:

الف) ظرفیت خازن چند برابر می‌شود؟

ب) بار خازن چند برابر می‌شود؟

پ) انرژی خازن چند برابر می‌شود؟

پاسخ:

الف: در حالتی که خازن به مولد وصل است ولتاژ خازن برابر ولتاژ مولد و ثابت فرض می‌شود و برای ظرفیت خازن می‌توان نوشت:

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \times \frac{A_2}{A_1} \times \frac{d_1}{d_2} \quad \kappa_1 = 1, \kappa_2 = 5 \quad d_2 = 3d_1 \rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{5}{1} \times \frac{1}{3} \rightarrow C_2 = \frac{5}{3} C_1$$

ب: بنابر رابطه $C = CV$ و با توجه به این که V ثابت است می‌توان نوشت:

$$\frac{q_2}{q_1} = \frac{C_2}{C_1} \times \frac{V_2}{V_1} \quad V_2 = V_1 \rightarrow \frac{q_2}{q_1} = \frac{5}{3}$$

پ: چون ولتاژ خازن ثابت است از رابطه $C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ استفاده می‌کنیم و داریم:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{C_2}{C_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 \rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{5}{3}$$

برای مشاهده اینیمیشن یا آزمایش، رمزیته روبه رو را اسکن کنید

(برگرفته از کتاب درسی)

۳۰۲. چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) خازن مانند باتری می‌تواند در مدار، جریان الکتریکی ثابت برقراز کند.

ب) خازن مانند باتری می‌تواند بار و انرژی الکتریکی در خود ذخیره کند.

پ) خازن برخلاف باتری می‌تواند انرژی را با آهنگ بسیار زیادی در مدار شارش دهد.

ت) اگر خازن را به یک باتری بیندیم شارش بار تا هنگامی ادامه می‌یابد که بار خازن برابر بار باتری شود.

۴

۳

۲

۱

۷. از حروف الفبای یونانی است که کاپا خوانده می‌شود.

۳۰۳. فاراد معادل است با:

۱) $\frac{1}{\text{کولن}} \text{ ولت}$

۲) $\text{کولن} \cdot \text{ولت}$

۳) $\frac{\text{زول}}{\text{ولت}}$

۴) $\frac{\text{کولن}}{\text{ولت}}$

(برگرفته از مسئله کتاب درس)

۳۰۴. اگر با تغییر منبع برق، اختلاف پتانسیل دو سر خازنی را ۴ برابر کنیم، ظرفیت آن چند برابر می‌شود؟

۱) ۴

۲) $\frac{1}{4}$

۳) $\frac{1}{16}$

۳۰۵. اختلاف پتانسیل بین دو صفحه خازن را از ۲۰ ولت به ۲۸ ولت تغییر می‌دهیم. اگر بار خازن $C = ۴ \mu\text{F}$ افزایش یابد، ظرفیت خازن چند میکروفواراد است؟

۱) ۱

۲) ۵

۳) ۸

۴) ۱۰

(برگرفته از مسئله کتاب درس)

۳۰۶. کدام گزینه درست است؟

۱) اگر خازن با بار Q پر شده باشد، بار هر صفحه آن $\frac{Q}{2}$ است.

۲) اگر بار هر صفحه خازن Q باشد، بار خالص دو صفحه خازن نیز Q است.

۳) برای پر کردن خازن، باتری بار الکتریکی موجود در خودش را به خازن منتقل می‌کند.

۴) هر قدر ظرفیت یک خازن بیشتر باشد برای ذخیره کردن مقدار معینی بار در آن ولتاز کمتری تیاز است.

۳۰۷. ظرفیت یک خازن تخت مربع شکل، که فاصله دو صفحه آن 10 mm است برابر $F = 10^{-11} \text{ F}$ است. اگر فضای بین دو صفحه خازن با

دی الکتریک $\kappa = 10$ پر شده باشد، طول هر ضلع صفحه خازن چند m است؟

۱) ۱۰^{-۸}

۲) ۱۰^{-۹}

۳) ۱۰^{-۱۰}

۴) ۱۰^{-۱۱}

۳۰۸. اگر فاصله دو صفحه خازن تخت را ۴ برابر و طول هر ضلع صفحه‌های آن را دو برابر کنیم، ظرفیت خازن چند برابر می‌شود؟

۱) ۱

۲) $\frac{1}{2}$

۳) $\frac{1}{4}$

۴) $\frac{1}{8}$

۳۰۹. اگر اختلاف پتانسیل دو سر یک خازن دو برابر شود، بار الکتریکی و ظرفیت آن به ترتیب از راست به چپ هر کدام چند برابر می‌شود؟

(برگرفته از مسئله کتاب درس)

۳۱۰. اگر میله ابوقیتی را با تلفون عالش دهیم و به خردوهای کاغذ نزدیک کنیم، خردوهای کاغذ جذب میله می‌شوند زیرا:

(برگرفته از مسئله کتاب درس)

۱) بار میله به خردوهای کاغذ منتقل می‌شود و میله و خردوهای کاغذ بار مخالف می‌باشد و جذب می‌شوند.

۲) میله بار همنام خودش یعنی منفی را از خردوهای کاغذ می‌راند و آن‌ها مثبت شده و جذب میله می‌شوند.

۳) میله مولکول‌های خردوهای کاغذ را قطبیده می‌کند و آن‌ها جذب میله می‌شوند.

۴) چون خردوهای کاغذ رسانا هستند میله در آن‌ها بار القا می‌کند و سپس جذب میله می‌شوند.

خازن متصل به مولد

۳۱۱. یک خازن به یک باتری متصل است. اگر صفحات خازن را در این حالت از یکدیگر دور کنیم:

۱) بار الکتریکی خازن ثابت می‌ماند.

۲) انرژی خازن ثابت می‌ماند.

۳) بار خازن افزایش می‌یابد.

۳۱۲. خازن تختی با عایقی با ثابت دی الکتریک $2 \mu\text{F}$ دارای ظرفیت $2 \times 10^{-11} \mu\text{C}$ و به اختلاف پتانسیل ۲۰۰ ولت وصل است. اگر در این وضعیت

عایق از بین دو صفحه خازن خارج شود، ظرفیت و بار خازن به ترتیب برابر است با:

۱) $2 \times 10^{-11} \mu\text{C}$ و $2 \mu\text{F}$

۲) $4 \times 10^{-11} \mu\text{C}$ و $4 \mu\text{F}$

۳) $2 \times 10^{-11} \mu\text{C}$ و $8 \mu\text{F}$

۴) $8 \mu\text{C}$ و $16 \times 10^{-11} \mu\text{F}$

۳۱۳. بین دو صفحه خازن مسطحی هوا است و دو سر آن به یک اختلاف پتانسیل الکتریکی ثابتی وصل است. اگر با ثابت ماندن فاصله بین

صفحات، یک تیغه شیشه‌ای بین آن صفحات قرار دهیم، بار الکتریکی خازن چگونه تغییر می‌کند؟

(برگرفته از مسئله کتاب درس)

۱) ثابت می‌ماند.

۲) کاهش می‌یابد.

۳) افزایش می‌یابد.

۴) بسته به ضخامت شیشه، ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

۳۱۴. خازنی با تیغه‌های موازی به باتری ای بسته شده است که ولتاژ خروجی آن ثابت است. اگر صفحه‌های خازن را از هم دور کنیم.....

(برگرفته از مسئله کتاب درس)

۱) میدان الکتریکی کم می‌شود و بار تیغه‌ها نیز کم می‌شود.

۲) میدان الکتریکی تغییر نمی‌کند، اما بار تیغه‌ها زیاد می‌شود.

۳) میدان الکتریکی تغییر نمی‌کند، اما بار تیغه‌ها کم می‌شود.

۴) میدان الکتریکی زیاد می‌شود اما بار تیغه‌ها کم می‌شود.



۳۱۵. صفحات خازنی که دیالکتریک آن هوا است به مولدی متصل است. در همین حال یک قطعه کانوچو بین صفحات آن قرار می‌دهیم. کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

- (۱) شدت میدان الکتریکی بین صفحات افزایش می‌یابد.
 (۲) تغییر شدت میدان الکتریکی به نوع کانوچو بستگی دارد.

۳۱۶. خازن سطحی به دو سر باتری وصل است. اگر فاصله بین صفحات آن را نصف کنیم، انرژی و بار الکتریکی آن به ترتیب از راست به چپ چند برابر می‌شود؟

$$(1) \frac{1}{2} \quad (2) \frac{1}{4} \quad (3) 4 \text{ و } 2 \quad (4) 2 \text{ و } \frac{1}{4}$$

۳۱۷. چگالی بار سطحی یک خازن تخت با دیالکتریک $\kappa = 5$ برابر $\left(\frac{C}{m^2}\right)$ است. بزرگی میدان الکتریکی بین دو صفحه این خازن

$$\text{چند } \frac{N}{C} \text{ است؟} \quad (1) 10^{-11} \frac{N}{m} \quad (2) 10^{-10} \frac{N}{m}$$

$$(3) 10^9 \quad (4) 2 \times 10^9 \quad (5) 5 \times 10^9 \quad (6) 12 \times 10^9$$

۳۱۸. یک خازن تخت به مولد وصل است. اگر دیالکتریک با ضریب ۸ را بین دو صفحه خازن قرار دهیم، چگالی سطحی بار الکتریکی خازن چند برابر می‌شود؟

$$(1) \frac{1}{8} \quad (2) \frac{1}{2} \quad (3) \frac{1}{4} \quad (4) \frac{1}{8}$$

۴) بسته به ولتاژ خازن می‌تواند گزینه‌های ۱ یا ۲ درست باشد.

۳۱۹. اگر اختلاف پتانسیل بین دو صفحه رسانای موافق هم، $200V$ و فاصله بین آن دو صفحه $4mm$ باشد، شدت میدان الکتریکی بین آن دو (الکترولیتیک)

$$(1) 50000 \quad (2) 5000 \quad (3) 500 \quad (4) 50$$

خازن جدا از مولد


۳۲۰. خازن سطحی را پس از بر شدن، از باتری جدا می‌کنیم. اگر بدون اتصال صفحات آن، دو صفحه را از هم دور کنیم، ظرفیت و اختلاف پتانسیل بین دو صفحه به ترتیب (از راست به چپ) چگونه تغییر می‌کند؟ (جزئی ۸۳)

- (۱) افزایش - افزایش (۲) کاهش - کاهش (۳) کاهش - افزایش (۴) افزایش - کاهش

۳۲۱. خازن سطحی را از باتری جدا کرده و سپس فاصله بین صفحات آن را دوباره می‌کنیم. ولتاژ، انرژی و ظرفیت آن به ترتیب چگونه تغییر می‌کنند؟

- (۱) افزایش - کاهش - افزایش (۲) کاهش - افزایش - افزایش
 (۳) کاهش - افزایش - کاهش (۴) افزایش - افزایش - کاهش

۳۲۲. شکل‌های زیر خازنی را نشان می‌دهند که در دو حالت به یک ولت سنج متصل است. کدام گزینه زیر درباره این شکل می‌تواند درست باشد؟ (بر اساس از پرسنل کتاب درسی)



۳۲۳. خازن پرشده‌ای را از باتری جدا کرده و دیالکتریک بین صفحات را بر می‌داریم. ظرفیت، انرژی و اختلاف پتانسیل آن به ترتیب از راست به چپ می‌باشد.

- (۱) کاهش - کاهش - کاهش (۲) افزایش - افزایش - افزایش
 (۳) افزایش - افزایش - کاهش (۴) افزایش - کاهش - افزایش


۳۲۴. اگر با نایت نگه داشتن بار الکتریکی یک خازن فاصله بین صفحات آن را نصف کنیم، میدان الکتریکی بین دو صفحه آن چند برابر می‌شود؟ (بر اساس از مسئله کتاب درسی)

$$(1) \frac{1}{2} \quad (2) \sqrt{2} \quad (3) 2 \quad (4) \sqrt{2}$$

۳۲۵. خازنی را پس از شارژ شدن از مولد جدا می‌کنیم. سپس فاصله دو صفحه خازن را به نصف مقدار اولیه می‌رسانیم و در مرحله بعدی دیالکتریک $\kappa = 4$ را بین صفحه‌های آن قرار می‌دهیم. چگالی بار الکتریکی سطحی صفحات خازن چند برابر می‌شود؟

$$(1) \frac{1}{2} \quad (2) 1 \quad (3) 2 \quad (4) 4$$

۳۲۶. دو صفحه فلزی A و B مطابق شکل زیر موازی هم قرار دارند. صفحه A را به زمین و صفحه B را به الکتروسکوب وصل کرده‌ایم. ورقه‌های الکتروسکوب باز هستند. اگر یک صفحه شیشه‌ای بدون بار بین این دو صفحه وارد کنیم، انحراف ورقه‌های الکتروسکوب:



(۱) کم می‌شود.

(۲) ابتدا زیاد و سپس کم می‌شود.

(۳) زیاد می‌شود.

(۴) تغییر نمی‌کند.

انرژی خازن

۳۲۷. اگر انرژی ذخیره شده در خازنی به ظرفیت ۴ میکروفاراد $\frac{7}{2} \text{ میلیزول}$ باشد، اختلاف پتانسیل بین دو سر خازن چند ولت است؟

(۱) ۶۰

(۲) ۲۰

(۳) ۶

(۴) ۲۰

۳۲۸. انرژی ذخیره شده در خازنی که به اختلاف پتانسیل 1kV وصل است برابر 1kWh است. ظرفیت این خازن چند میکروفاراد است؟
(زبان: مخارج)

(۱) ۷۲

(۲) ۳۶

(۳) $7/2$

(۴) $2/6$

۳۲۹. با تخلیه قسمتی از بار الکتریکی یک خازن پُر شده، اختلاف پتانسیل دو سر آن 8v درصد کاهش می‌باید. انرژی این خازن چند درصد کاهش می‌باید؟
(زبان: مخارج)

(۱) ۹۶

(۲) ۸۰

(۳) ۶۴

(۴) ۴۰

۳۳۰. ظرفیت خازنی $22\mu\text{F}$ است. اگر بار الکتریکی آن 2v درصد افزایش باید، انرژی آن $16\text{ میکروزول افزایش می‌باید}$. بار اولیه آن چند میکروکول است؟
(زبان: مخارج)

(۱) 4×10^{-7}

(۲) 2×10^{-7}

(۳) 4×10^{-6}

(۴) 2×10^{-6}

۳۳۱. در شکل زیر، در حالتی که کلید بسته است انرژی خازن برابر U می‌باشد. در این حالت، d به فاصله دو صفحه خازن اضافه می‌کنیم. سپس کلید K را باز می‌کنیم و دیالکتریک $\epsilon = 2$ را جایگزین هوای بین دو صفحه خازن می‌کنیم. انرژی خازن چند برابر U می‌شود؟
(زبان: مخارج)

(۱) ۲

(۲) $\frac{1}{2}$

(۳) $\frac{1}{2}$

۳۳۲. خازنی به ولتاژ ثابت V وصل است. اگر آن را از منبع جدا و فاصله دو صفحه آن را سه برابر کنیم، انرژی خازن چند برابر می‌شود؟ دلیل این تغییر انرژی چیست؟

(۱) $\frac{1}{3}$ ، انرژی منبع (باتری)

(۲) کار ما

(۳) $\frac{1}{3}$ ، انرژی منبع (باتری)

(۴) کار ما

۳۳۳. یک خازن خالی را به یک باتری می‌بندیم و باتری $24\mu\text{C}$ کار انجام می‌دهد و $12\mu\text{C}$ بار در خازن ذخیره می‌شود. ظرفیت خازن چند میکروفاراد است؟
(زبان: مخارج)

(۱) ۱۲

(۲) ۶

(۳) ۳

(۴) ۲

۳۳۴. در یک خازن تخت با میدان الکتریکی یکنواخت $\frac{V}{m} = 1000$ ، الکترونی از حال سکون و از مجاور صفحه منفی شتاب می‌گیرد و با سرعت $v = 1.7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به صفحه مقابل می‌رسد. فاصله دو صفحه از هم کدام است؟ $e = 1/6 \times 10^{-19}\text{C}$ ، $m_e = 9/1 \times 10^{-31}\text{kg}$
(زبان: مخارج)

(۱) $2/84\text{mm}$

(۲) $28/4\text{cm}$

(۳) $2/84\text{cm}$

(۴) $2/84\text{m}$

به هم بستن دو خازن به یکدیگر

۳۳۵. خازنی به ظرفیت $C_1 = 3\mu\text{F}$ را با ولتاژ $V = 12\text{v}$ پر می‌کنیم. سپس آن را از مولد جدا کرده و دو صفحه آن را به دو سر خازن خالی $C_2 = 6\mu\text{F}$ می‌بندیم. اختلاف پتانسیل خازن C_1 چند ولت می‌شود؟
(زبان: مخارج)

(۱) ۱۲۰

(۲) ۸۰

(۳) ۴۰

(۴) ۲۰

۳۳۶. یکی از دو خازن مشابه را با ولتاژ 200 ولت و دیگری را با ولتاژ 400 ولت پر کرده و از مولد جدا صفحه‌های ناهمنمای آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. اگر ظرفیت هریک $5\mu\text{F}$ باشد، اختلاف پتانسیل مشترک آن‌ها ولت و بار ذخیره شده در هو یک میکروکول خواهد بود.
(زبان: مخارج)

(۱) 1500 و 300

(۲) 500 و 100

(۳) 3000 و 600

(۴) صفر و صفر



بنابر رابطه چگالی سطحی بار کره یعنی $\sigma = \frac{Q}{4\pi r^2}$ می‌توان نسبت چگالی سطحی بار دو کره را به صورت زیر نوشت:

$$\frac{\sigma_A}{\sigma_B} = \frac{Q_A}{Q_B} \times \left(\frac{r_B}{r_A}\right)^2 \rightarrow \frac{\sigma_A}{\sigma_B} = \frac{Q_A}{Q_B} \times \left(\frac{2r_A}{r_A}\right)^2 \rightarrow \frac{Q_A}{Q_B} = \frac{1}{4}$$

اگر بخواهیم نسبت بار دو کره برابر نسبت شعاع آنها شود، باید $\frac{Q'_A}{Q'_B} = \frac{r_A}{r_B} = \frac{1}{2}$ شود پس می‌توان نوشت:


$$Q_A = \frac{1}{4} Q_B \text{ و } Q'_A = \frac{1}{2} Q'_B$$

اما چون بار الکتریکی فقط بین دو کره مبادله شده است، بنابر پایستگی بار الکتریکی می‌توان گفت که مجموع بارهای الکتریکی دو کره قبل از جایه‌جایی با بعد از جایه‌جایی بارها یکسان است و داریم:

$$Q'_A + Q'_B = Q_A + Q_B \rightarrow \frac{1}{2} Q_B + Q_B = \frac{1}{4} Q_B + Q_B \rightarrow \frac{3}{2} Q'_B = \frac{9}{4} Q_B$$

$$\frac{Q'_B}{Q_B} = \frac{3}{4} \xrightarrow{\text{تبیین در صورت}} \frac{\Delta Q_B}{Q_B} = \frac{3-4}{4} \Rightarrow \frac{\Delta Q_B}{Q_B} = \frac{-1}{4} = -0.25$$

راهبرد ۱۶



می‌دانیم که میدان الکتریکی درون جسم رسانایی که بار الکتریکی ساکن و منزوی دارد صفر است. زیرا اگر درون جسم رسانای میدان الکتریکی برقرار باشد، به بارهای آزاد جسم رسانای نیروی الکتریکی وارد می‌شود و شتاب می‌گیرند.

اگر بارهای الکتریکی اضافه شده به جسم رسانا به گونه‌ای در سطح جسم قرار گیرند که بتوانند با میدان‌های الکتریکی شان برهمنیرو وارد کنند یکدیگر را می‌رانند تا از هم دور شوند و به تعادل برسند. در شکل (ب) با خم شدن صفحه، بارهای الکتریکی سطح A می‌توانند بر یکدیگر نیروی دافعه وارد کنند. به عبارت دیگر یکدیگر را می‌بینند و از هم دور می‌شوند اما در سطح B، بارهای الکتریکی نیروی رانشی بسیار کمتری بر هم وارد می‌کنند زیرا برای اعمال نیرو به یکدیگر باید میدان‌های الکتریکی آنها از رسانا عبور کند که می‌دانیم میدان داخل این رسانا صفر است.

به عبارت دیگر بارهای الکتریکی اضافه شده در سطح B کمتر می‌توانند یکدیگر را ببینند. پس می‌توانند به یکدیگر نزدیکتر شوند و تراکم بار در این سطح بیشتر از تراکم بار در سطح A شود. از این بحث می‌توان توجیه کرد که چرا در نقاط نوک‌تیز در سطح خارجی چگالی سطحی بار الکتریکی (تراکم بار) بیشتر از نقاط دیگر است. در شکل (۲) بار منفی در داخل جسم رسانای توحالی است به توزیع بار درون و بیرون جسم دقت کنید.

در این سؤال نیز برآختی می‌توان دریافت $\sigma_B > \sigma_A$ است.

اول این که می‌دانیم بار الکتریکی القایی (ناشی از وجود Q که درون جسم رساناست) در سطوح داخلی رسانا مخالف صفر است. پس **گزینه ۱** نادرست است. دوم این که در نقاط نوک‌تیز سطح خارجی جسم رسانای چگالی سطحی بار بیشتر از نقاط دیگر است پس **گزینه ۲** هم نادرست است. اما با توجه به راهبرد ۱۶، می‌دانیم در گوشه‌های داخلی رسانا تراکم بار الکتریکی کمتر از دیگر نقاط سطح داخلی رسانا است از این رو **گزینه ۲** نیز نادرست است.

فقط عبارت پ درست است.

خازن مانند باتری انرژی ذخیره می‌کند اما ذخیره شدن بار در خازن مانند باتری نیست زیرا باتری بار ذخیره نمی‌کند. همچنین پوشش خازن تا هنگامی ادامه می‌یابد که اختلاف پتانسیل دو صفحه آن برابر اختلاف پتانسیل دو پایانه باتری شود.


هنگامی که انرژی خازن خالی شود جریان الکتریکی ثابتی در مدار برقرار نمی‌شود.

$$C = \frac{q}{V} \quad (\text{فراز})$$

با توجه به رابطه $C = \frac{q}{V}$ می‌توان نوشت:


آشنایی با خواص مغناطیسی و میدان مغناطیسی

- ۱ اولین بار خاصیت مغناطیسی به صورت طبیعی در ماده کانی مگنتیت (Fe_3O_4) دیده شد.
- ۲ هر آهنربا دو قطب دارد. در محل قطب‌های آهنربا خاصیت مغناطیسی از سایر نقاط شدیدتر است.
- ۳ اگر یک آهنربا را از مرکز نقل خود (گرانیگاه)، از نقطه‌ای بیاویزیم، قطبی از آن که به سمت شمال جغرافیایی قرار می‌گیرد را N و قطبی که به سمت جنوب جغرافیایی قرار می‌گیرد را S می‌نامیم. قطب‌های هم‌نام همدیگر را ادفع و قطب‌های نام‌نام همدیگر را جذب می‌کنند.
- ۴ جهت خطوط میدان مغناطیسی در هر آهنربا در فضای بیرون آن از قطب N به سمت قطب S و در درون آهنربا از قطب S به قطب N است. عقربه مغناطیسی (قطب‌نما) که یک آهنربای کوچک است، مماس بر این خطوط و در جهت خطوط می‌ایستد.




میدان مغناطیسی یکنواخت
میدان مغناطیسی بیکنواخت

- ۵ خطوط میدان مغناطیسی برای تجسم میدان مغناطیسی رسم می‌شود. خطوط میدان مغناطیسی حتماً بسته‌اند و هیچ‌گاه همدیگر را قطع نمی‌کنند. این خطوط هر جا متراکم‌تر باشند، خاصیت مغناطیسی در آن نقطه شدیدتر است. اگر خطوط میدان با هم موازی بوده و از یکدیگر فاصله یکسانی داشته باشند، میدان یکنواخت و شدت میدان در تمام نقاط آن یکسان است.




میدان مغناطیسی زمین

- ۱ زمین مثل یک آهنربای بزرگ است که قطب‌های مغناطیسی آن کاملاً بر قطب‌های جغرافیایی منطبق نمی‌باشد. اکنون فاصله بین قطب‌های جغرافیایی و مغناطیسی حدود ۱۸۰۰ کیلومتر است. انحراف عقربه قطب‌نما با امتداد شمال - جنوب جغرافیایی را زاویه میل مغناطیسی می‌نامند.
- ۲ همان‌طور که دیده می‌شود قطب شمال مغناطیسی مجاور قطب جنوب جغرافیایی و قطب جنوب مغناطیسی مجاور قطب شمال جغرافیایی قرار می‌گیرد.



- ۳ عقربه قطب‌نما در محدوده استوا بطور افقی قرار می‌گیرد. اما در سایر نقاط، امتداد آن با افق زوایه‌ای می‌سازد که به این زوایه شبکه مغناطیسی گفته می‌شود.



خاصیت القای مغناطیسی

- هرگاه قطعه‌ای از آهن را به یک آهنربا نزدیک کنیم، در اثر میدان مغناطیسی آهنربا، قطعه آهن هم خاصیت مغناطیسی پیدا می‌کند. چنین پدیده‌ای را خاصیت القای مغناطیسی می‌نامیم.
- سری از قطعه آهنی که مجاور قطبی از آهنرباست، با آن ناهمنام شده و در اثر خاصیت القای مغناطیسی همدیگر را جذب می‌کنند.



برای مشاهده اینمیشن یا آزمایش، رمزینه رو به رو را اسکن نمایید.

۳۰۴

ظرفیت یک خازن به ولتاژ آن بستگی ندارد. ظرفیت خازن به ساختمان خازن و دیالکتریک آن بستگی دارد. مثلاً حجم یک بطری آب، به مقدار آب یا ارتفاع آب درون آن بستگی ندارد. خازن نیز اگر به اختلاف پتانسیل بیشتری بسته شود بار بیشتری می‌باید اما ظرفیت آن ثابت می‌ماند.

۳۰۵

از رابطه $q = CV$ استفاده می‌کنیم و برای دو حالت بکار می‌بریم:

$$q = CV \begin{cases} q_1 = CV_1 \\ q_2 = CV_2 \end{cases} \Rightarrow q_2 - q_1 = C(V_2 - V_1) \Rightarrow \Delta q = C\Delta V \xrightarrow{\Delta V = 2V - 2V = 8V} 4.(\mu C) = C \times 8(V)$$

$$\Rightarrow C = \frac{4.(\mu C)}{8(V)} = 5\mu(\frac{C}{V}) \xrightarrow{\frac{C}{V} = F} C = 5\mu F$$

۳۰۶

بنابر آنچه در درسنامه آمده است، بار صفحه‌های خازن $+Q$ و $-Q$ است و مجموع بار دو صفحه برابر صفر است. برای پر کردن خازن با تری بار الکتریکی منفی را از یک صفحه به صفحه دیگر خازن منتقل می‌کند و از خود با تری بار به خازن منتقل نمی‌شود.

بنابر رابطه $q = CV$ ، برای ایجاد بار معین در یک خازن، هر قدر ظرفیت بیشتر باشد ولتاژ کمتری مورد نیاز است.

۳۰۷

از رابطه ظرفیت خازن یعنی $C = \kappa\epsilon \frac{A}{d}$ استفاده می‌کنیم تا مساحت هر صفحه (A) را بدست آوریم:

$$1 = 1 \times 10^{-11} \times \frac{A}{1 \times 10^{-3}} \Rightarrow A = 10^8 m^2 \xrightarrow{A = l^2} l^2 = 10^8 \Rightarrow l = 10^4 m$$

این عدد نشان می‌دهد یک فاراد ظرفیت بسیار بزرگی است.

۳۰۸

اگر هر ضلع صفحه خازن را دوباره کنیم، مساحت آن چهار برابر می‌شود:

$$C = \kappa\epsilon \frac{A}{d} \rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \times \frac{A_2}{A_1} \times \frac{d_1}{d_2} \rightarrow \frac{C_2}{C_1} = 1 \times \frac{4A_1}{A_1} \times \frac{d_1}{4d_1} = 1$$


۳۰۹

می‌دانیم که ظرفیت خازن به اختلاف پتانسیل دو سر آن بستگی ندارد. اما باز الکتریکی خازن متناسب با اختلاف پتانسیل دو سر آن است. زیاد می‌شود ∇ / ∇ $\Rightarrow q = C \nabla / \nabla$ ثابت

$$\frac{q_2}{q_1} = \frac{C_2}{C_1} \times \frac{V_2}{V_1} \xrightarrow{C_2 = C_1} \frac{q_2}{q_1} = 1 \times \frac{2V_1}{V_1} \Rightarrow \frac{q_2}{q_1} = 2 \Rightarrow q_2 = 2q_1$$

۳۱۰

خرده‌های کاغذ و میله نارسانا هستند و با نزدیک شدن میله به خرده‌های کاغذ، میدان الکتریکی میله مولکول‌های خرده کاغذ را دوقطبی (قطبیده) می‌کند و در نتیجه بارهای مثبت و منفی آن‌ها از هم جدا می‌شوند و باز مخالف ایجاد شده در خرده‌های کاغذ نزدیک به باز میله ایجاد می‌شود و نیروی جاذبه بارهای مخالف بیشتر از نیروی دافعه بارهای موافق با میله می‌شود و خرده‌های کاغذ جذب میله می‌شوند.



۳۱۱

همانگونه که در مبحث اثر دیالکتریک بر خازن بیان کردیم، اگر خازن به یک با تری متصل باشد، چون اختلاف پتانسیل دو سر با تری را ثابت درنظر می‌گیریم با تغییر ظرفیت خازن، اختلاف پتانسیل دو سر خازن برابر اختلاف پتانسیل دو سر با تری و ثابت خواهد بود. در این حالت می‌توان نوشت:

$$q = CV \xrightarrow{\text{ثابت}} \frac{q_2}{q_1} = \frac{C_2}{C_1}$$

$$U = \frac{1}{2} CV^2 \xrightarrow{\text{ثابت}} \frac{U_2}{U_1} = \frac{C_2}{C_1}$$

$$E = \frac{V}{d} \xrightarrow{\text{ثابت}} \frac{E_2}{E_1} = \frac{d_1}{d_2}$$

يعنى اگر ظرفیت خازن (وصل به مولد) تغییر کند بار و انرژی خازن متناسب با ظرفیت خازن و میدان الکتریکی آن متناسب با عکس فاصله دو صفحه خازن تغییر می‌کند.

۳۱۲

راهبرد ۱۷

در این سوال نیز (ثابت = خازن V) است و با استفاده از رابطه $C = \kappa\epsilon \frac{A}{d}$ ابتدا می‌توان تغییرات ظرفیت خازن را مشخص کرد سپس با توجه به رابطه $q = CV$ چگونگی بار الکتریکی را مشخص کنیم:

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \times \frac{A_2}{A_1} \times \frac{d_1}{d_2} \quad \kappa_2 = \kappa_1 \rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{d_1}{d_2} \quad d_2 > d_1 \rightarrow C_2 < C_1$$

$$q = CV \quad \text{ظرفیت کم شده است} \rightarrow \frac{q_2}{q_1} = \frac{C_2}{C_1} < 1 \Rightarrow q_2 < q_1 \quad \text{پس ظرفیت کم شود و بار خازن نیز کاهش می‌باید.}$$

۳۱۲.

ابتدا بار خازن را با استفاده از رابطه $q = CV$ به دست می‌آوریم. سپس چون خازن به ولتاژ ۲۰۰ ولت وصل است، ولتاژ خازن ثابت می‌ماند و با تغییر ظرفیت خازن بار آن نیز تغییر می‌کند پس می‌توان نوشت:

$$q = 4 \times 10^{-9} (\mu F) \times 200 (V) = 8 (\mu C)$$

و چون ثابت دیالکتریک خازن از $2 = k_2 = 1$ به $k_1 = 1$ تغییر کرده است می‌توان نوشت:

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{k_2}{k_1} \rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{1}{2} \rightarrow C_2 = 4 \times 10^{-9} (\mu F) \times \frac{1}{2} = 2 \times 10^{-9} \mu F$$

$$\frac{q_2}{q_1} = \frac{C_2}{C_1} \times \frac{V_2}{V_1} \quad V_2 = V_1 \rightarrow \frac{q_2}{q_1} = \frac{1}{2} \rightarrow q_2 = 8 (\mu C) \times \frac{1}{2} = 4 \mu C \quad \text{و بار خازن برابر می‌شود با:}$$

۳۱۳.

می‌دانید که اگر خازنی به باتری وصل باشد، ولتاژ باتری و در نتیجه ولتاژ خازن را ثابت درنظر می‌گیریم و بنابر رابطه $C = \kappa\epsilon \frac{A}{d}$ اگر شیشه را به خازن وارد کنیم ثابت دیالکتریک (K) زیاد می‌شود پس ظرفیت خازن هم افزایش می‌باید. اما از رابطه $q = CV$ می‌توانیم بنویسیم: q بار خازن زیاد شده است. \rightarrow ظرفیت زیاد شده است \rightarrow (ثابت) $V = CV$

۳۱۴.

از آنجه که در درسنامه، درباره میدان الکتریکی ذکر شد، می‌دانیم میدان الکتریکی خازن تخت از رابطه $E = \frac{V}{d}$ به دست می‌آید. در این سوال چون خازن به مولد بسته شده است، از راهبرد ۱۶ می‌دانیم ولتاژ آن یعنی V ثابت است و با افزایش فاصله صفحه‌های خازن، میدان الکتریکی خازن کم می‌شود. یعنی:

$$E = \frac{V}{d} \quad \text{کم می‌شود} \rightarrow E \quad \text{زیاد شده}$$

$$C = \kappa\epsilon \frac{A}{d} \quad \text{کاهش می‌باید.}$$

$$q = CV \quad \text{کم می‌شود.} \quad \text{کاهش بافت} \rightarrow q \quad \text{ثابت}$$

اما درباره بار خازن باید از رابطه $q = CV$ و ظرفیت خازن استفاده کنیم:

۳۱۵.

چون خازن به مولد وصل است ولتاژ خازن ثابت است. اما می‌دانیم میدان الکتریکی خازن تخت از رابطه $E = \frac{V}{d}$ مشخص می‌شود و در این سوال علاوه بر V (که ثابت است) فاصله دو صفحه خازن (d) نیز ثابت مانده پس میدان الکتریکی خازن نیز ثابت نمی‌کند.

$$E = \frac{V}{d} \quad \text{ثابت می‌ماند.} \rightarrow E$$

۳۱۶.

در این حالت ولتاژ خازن ثابت است و ابتدا تغییر ظرفیت خازن را مشخص می‌کنیم ($C = \kappa\epsilon \frac{A}{d}$). سپس از رابطه‌های (ثابت) $U = \frac{1}{2} CV^2$ و $q = CV$ ، تغییرات انرژی و بار خازن را به دست می‌آوریم.

$$C = \kappa\epsilon \frac{A}{d} \quad d_2 = \frac{1}{2} d_1 \rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{d_1}{d_2} = 2$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{C_2}{C_1} = 2 \quad \text{و} \quad q = CV_{(\text{ثابت})} \rightarrow \frac{q_2}{q_1} = \frac{C_2}{C_1} = 2$$

۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷


مهروشاه

۱. چهار نقطه A، B، C و D روی یک صفحه قرار دارند و آهنربای تیغهای نیز روی همین صفحه است. در کدام نقطه، جهت میدان مغناطیسی حاصل از آهنربای درست نشان داده شده است؟




- D (۱)
C (۲)
B (۳)
A (۴)

۲. شکل زیر یک آهنربای میله‌ای معمولی را نشان می‌دهد که در اطراف آن ۴ عقربه مغناطیسی قرار دارند. جهت قرارگرفتن عقربه‌های (رنگی) C و B به ترتیب کدام است؟



- ، → (۱)
←، → (۲)
→، → (۳)
←، ← (۴)

۳. در کدام یک از شکل‌های زیر عقربه مغناطیسی جهت میدان مغناطیسی آهنربای را در نقطه M که به یک فاصله از دو قطب آهنربایست درست نشان می‌دهد؟



۴. یک آهنربای میله‌ای مطابق شکل رویه‌رو، روی یک میز قرار دارد. یک عقربه مغناطیسی که آزادانه می‌تواند حول محور قائم بر میز بچرخد به آرامی روی مسیر دایره‌ای شکل به دور آهنربای یک دور می‌چرخد. در این مسیر عقربه چند درجه دوران می‌کند؟

- ۱۸۰ (۱)
۲۷۰ (۲)
۳۶۰ (۳)
۷۲۰ (۴)

(آنکه از زیرهای)




۵. جهت میدان مغناطیسی در نقطه A که فقط حاصل اثر دو آهنربای مشابه می‌باشد، کدام است؟

A




- ↓ (۱)
↑ (۲)
← (۳)
→ (۴)

۶. P و P' دو قطب از دو آهنربای تیغهای هستند. اگر میدان مغناطیسی در نقطه O روی عمودمنصف PP' به صورت بردار B باشد، در این صورت P و P' به ترتیب از راست به چه عبارتند از:



- N، N (۱)
S، N (۲)
N، S (۳)
S، S (۴)



۷. میله‌های A و B را به قطب N یک عقربه مغناطیسی نزدیک می‌کنیم. مشاهده می‌شود سری از A که به N نزدیک شده آن را دفع کرده و سری از B که به N نزدیک شده آن را جذب می‌کند. کدام گزینه قطب‌های N و S میله‌های A و B را درست نشان می‌دهد؟



و در مورد B چیزی نمی‌توان گفت

و در مورد A چیزی نمی‌توان گفت

راهبرد ۱۸

در حازن تحت رابطه بین چگالی سطحی بار هر صفحه آن با میدان الکتریکی بین صفحه‌های حازن از رابطه روابه و به دست می‌آید:

$$\sigma = \kappa \epsilon E$$

چرا؟! رابطه ظرفیت حازن تحت یعنی $\sigma = \frac{q}{A}$ و $C = \kappa \epsilon \cdot \frac{A}{d} \times V$ و همچنین تعریف چگالی بار سطحی $q = CV$ را در نظر بگیرید.

$$\sigma = \frac{q}{A} \quad q = CV \rightarrow \sigma = \frac{\kappa \epsilon \cdot \frac{A}{d} \times V}{A} \Rightarrow \sigma = \kappa \epsilon \cdot \frac{V}{d}$$

و چون میدان حازن یکنواخت است می‌توان از رابطه $E = \frac{V}{d}$ استفاده کرد و در رابطه فوق جای‌گذاری کرد و در نهایت داریم:

$$\sigma = \kappa \epsilon E$$

برای پاسخ به این سوال کافی است کمیت‌های معلوم را در این رابطه جای‌گذاری کنیم:

$$\sigma = \kappa \epsilon E \Rightarrow 5 \times 10^{-5} = 5 \times 10^{-11} E \Rightarrow E = 10^6 \frac{N}{C}$$

۳۱۸

چون حازن به مولد وصل است، ولتاژ حازن ثابت است و بنابر رابطه $E = \frac{V}{d}$ میدان الکتریکی حازن نیز ثابت می‌ماند (d ثابت است) پس

بنابر راهبرد ۱۸:

روش اول: اگر رابطه $\sigma = \kappa \epsilon E$ را در نظر بگیریم چون $\kappa = 8$ برابر شده است، σ نیز 8 برابر می‌شود.

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \times \frac{E_2}{E_1} \quad \frac{E_1 = E_2}{\kappa_1 = 8\kappa_2} \rightarrow \sigma_2 = 8\sigma_1$$

روش دوم:

با ورود دی الکتریک ظرفیت حازن زیاد (8 برابر) می‌شود و چون ولتاژ حازن ثابت است بنابر رابطه $(q = CV)$ ، بار حازن نیز 8 برابر می‌شود

و در نهایت بنابر تعریف چگالی سطحی بار یعنی $\delta = \frac{q}{A}$ چون A ثابت و q ، 8 برابر شده است، می‌توان نتیجه گرفت چگالی سطحی بار صفحه حازن نیز 8 برابر شده است.

۳۱۹

$$|\Delta V| = Ed \Rightarrow E = \frac{200}{4 \times 10^{-2}} = 50000 \frac{N}{C}$$

می‌توان از رابطه شدت میدان الکتریکی برای حازن استفاده کرد و نوشت:

۳۲۰

راهبرد ۱۹

اگر حازن به یک مولد وصل و شارژ شود و سپس آن را از مولد جدا کنیم و منزوی بماند، چون حازن به جسم دیگری وصل نیست و نمی‌تواند بار مبادله کند، بار حازن در صفحه‌ها نیز تغییر نمی‌کند، «یعنی اگر ظرفیت حازن را تغییر دهیم، بار حازن ثابت می‌ماند». این تغییر ظرفیت سبب می‌شود ولتاژ حازن، انرژی و میدان الکتریکی حازن تغییر کند؛ و برای تعیین چگونگی تغییر هر یک از این کمیت‌ها می‌توان نوشت:

$$\left\{ \begin{array}{l} q = CV \rightarrow \frac{q_2}{q_1} = \frac{C_2}{C_1} \times \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{C_1}{C_2} \\ U = \frac{q}{\kappa C} \rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{C_1}{C_2} \times \left(\frac{q_2}{q_1} \right)^2 \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{C_1}{C_2} \\ E = \frac{V}{d} \rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \frac{V_2}{V_1} \times \frac{d_1}{d_2} \end{array} \right.$$

یعنی «در حازن منزوی، ولتاژ و انرژی حازن متناسب با وارون (عکس) ظرفیت حازن هستند».

$$C = \kappa \epsilon \cdot \frac{A}{d} \xrightarrow{\text{زیاد شده است}} \frac{C_2}{C_1} = \frac{d_1}{d_2} \Rightarrow C$$

در این سوال نیز می‌توان نوشت:

$$q = CV \rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{C_1}{C_2} \xrightarrow{C_1 < C_2} \frac{V_2}{V_1} > 1 \Rightarrow V$$

و برای تعیین چگونگی تغییر ولتاژ حازن داریم:

۳۲۱.

خازن متزوى است و بار هر صفحه آن ثابت می‌ماند. بنابراین ابتدا تغییر ظرفیت خازن سبب تغییر ولتاژ و انرژی خازن را مشخص می‌کنیم:

$$C = \kappa \epsilon \cdot \frac{A}{d} \xrightarrow{d_r = \frac{1}{2} d_i} \frac{C_r}{C_i} = \frac{d_i}{d_r} = \frac{1}{2}$$

$$q = CV \xrightarrow{\substack{\text{کاهش باشه} \\ \text{ثابت است}}} \frac{V_r}{V_i} = \frac{C_i}{C_r}$$

$$U = \frac{1}{2} qV \xrightarrow{\substack{\text{انرژی افزایش می‌باید.} \\ \text{ظرفیت کاهش باشه}}} \frac{U_r}{U_i} = \frac{C_i}{C_r}$$

برای محاسبه تغییرات انرژی می‌توان از رابطه $\frac{1}{2} qV = U$ نیز استفاده کرد:

$$\frac{U_r}{U_i} = \frac{q_r}{q_i} \times \frac{V_r}{V_i} \xrightarrow{\substack{\text{ثابت است} \\ q = CV}} \frac{U_r}{U_i} = \frac{V_r}{V_i} \xrightarrow{\substack{\text{زیاد شده} \\ V_r > V_i}} U_r > U_i$$

۳۲۲.

خازن از مولد جداست و بار آن ثابت مانده است و با ورود دیالکتریک به آن ولتاژ خازن کاهش یافته است. پس از رابطه $q = CV$ می‌توان دریافت ظرفیت خازن زیاد شده است.

۳۲۳.

برداشتن دیالکتریک خازن سبب کاهش ظرفیت آن می‌شود.

و چون خازن از باتری جدا و متزوى است تغییر اختلاف پتانسیل و انرژی آن را می‌توان به صورت زیر مشخص کرد:

$$q = CV \xrightarrow{\substack{\text{ثابت است} \\ \text{افزایش یافته}}} \frac{V_r}{V_i} = \frac{C_i}{C_r} \xrightarrow{\substack{\text{کاهش باشه} \\ C_r = C_i}}$$

$$U = \frac{1}{2} qV \xrightarrow{\substack{\text{ثابت است} \\ q = \text{افزایش یافته}}} U_r = U_i$$

۳۲۴.

توجه داریم که بار خازن ثابت (یعنی خازن متزوى) است. اگر فاصله صفحه‌های خازن را نصف کنیم ظرفیت خازن دو برابر می‌شود:

$$C = \kappa \epsilon \cdot \frac{A}{d} \xrightarrow{\substack{\text{کاهش باشه} \\ d_r = \frac{1}{2} d_i}} \frac{C_r}{C_i} = \frac{d_i}{d_r} = 2$$

اما در این حالت که q ثابت است، ولتاژ خازن متناسب با عکس ظرفیت خازن تغییر می‌کند یعنی:

$$q = CV \xrightarrow{\substack{\text{ثابت است} \\ C = 2C_i}} \frac{V_r}{V_i} = \frac{C_i}{C_r} = \frac{1}{2}$$

یعنی ولتاژ خازن نصف شده است. می‌دانیم میدان الکتریکی خازن از رابطه $E = \frac{V}{d}$ به دست می‌آید. پس از رابطه $E = \frac{V}{d}$ می‌توان استفاده

$$E = \frac{V}{d} \Rightarrow \frac{E_r}{E_i} = \frac{V_r}{V_i} \times \frac{d_i}{d_r} \xrightarrow{\substack{\text{کاهش باشه} \\ d_r = \frac{1}{2} d_i \\ V_r = \frac{1}{2} V_i}} \frac{E_r}{E_i} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

۳۲۵.

می‌دانیم که چگالی بار الکتریکی سطحی یک خازن تخت از رابطه $\sigma = \frac{q}{A}$ یا $\sigma = \kappa \epsilon E$ به دست می‌آید. اما چون خازن از مولد جدا شده با تغییر

فاصله دو صفحه و دیالکتریک آن، بار خازن ثابت می‌ماند و در نتیجه بنا بر رابطه $\sigma = \frac{q}{A}$ (مقدار q و A ثابت)، چگالی سطحی بار تغییر نمی‌کند.

۳۲۶.

در این سؤال دقت کنید که هرچند خازن به مولد وصل نیست اما همان‌طور که در راهبرد بیان کردیم به دلیل وصل بودن خازن به یک جسم (اینجا الکتروسکوپ) با تغییر ظرفیت خازن بار خازن ثابت نمی‌ماند. خازن می‌تواند با الکتروسکوپ بار مبادله کند. اما چگونه؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا چگونگی تغییر میدان الکتریکی خازن را مشخص می‌کنیم سپس چگونگی تغییر بار آن را تعیین می‌کنیم؛ از درسنامه دریافتیم که ورود دیالکتریک (در اینجا شیشه) در خازن سبب کاهش میدان الکتریکی خازن و در نتیجه ولتاژ خازن می‌شود.

$$E = \frac{V}{d} \xrightarrow{\substack{\text{کاهش می‌باید.} \\ d = \text{ثابت است}}} V$$

چون خازن به الکتروسکوپ وصل است و الکتروسکوپ می‌تواند با خازن بار مبادله کند، کاهش ولتاژ خازن سبب می‌شود که تعادل الکتروستاتیکی خازن با الکتروسکوپ برای یک لحظه از بین برود و خازن از الکتروسکوپ بار بگیرد تا دوباره با آن به تعادل الکتروستاتیکی برسد. در نتیجه بار الکتروسکوپ کاهش می‌باید و فاصله ورقه‌های آن کم می‌شود.

۱۰
۹
۸
۷
۶

۱۴۶

۱۰
۹
۸
۷
۶

۱۰
۹
۸
۷
۶



۸. یک آهن و یک آهنربا که از نظر ظاهر کاملاً مشابهند، در اختیار داریم. تنها با ملاحظه تیروی این دو بر یکدیگر، کدام گزینه درباره تشخیص آهن از آهنربا و تشخیص قطب‌های آهنربا درست است؟
(برگرفته از من کتاب درس)

- (۱) آهنربا مشخص شده ولی قطب‌ها مشخص نمی‌شود.
- (۲) آهنربا و قطب‌هایش مشخص می‌شود.
- (۳) نه آهنربا و نه قطب‌ها مشخص نمی‌شود.
- (۴) اظهارنظر قطعی میسر نیست.


۹. «خطوط میدان مغناطیسی خطوط بسته‌ای هستند.» این مطلب با کدام گزینه رابطه نزدیکی دارد؟
(برگرفته از من کتاب درس)

- (۱) آهنربای تک قطبی وجود ندارد.
- (۲) نیرو در راستای میدان است.
- (۳) نزدیک آهنربا میدان قوی است.
- (۴) میدان مغناطیسی از همه مواد عبور می‌کند.

۱۰. در کدام شکل نحوه قوارگرفتن سوزن‌های آویخته از آهنربا نادرست نشان داده شده است؟
(برگرفته از من کتاب درس)




۱۱. کدام گزینه معرف میدان مغناطیسی یکنواخت است؟



۱۲. در مورد میدان مغناطیسی زمین کدام گزینه درست است؟
(برگرفته از من کتاب درس)

- (۱) قطب N مغناطیسی در شمال جغرافیایی قرار دارد و به همین دلیل به آن قطب N می‌گویند.
- (۲) منظور از میل مغناطیسی، زاویه‌ای است که امتداد عقریه مغناطیسی با سطح افق می‌سازد.
- (۳) شب مغناطیسی، انحراف امتداد عقریه مغناطیسی با امتداد شمال - جنوب جغرافیایی است.
- (۴) قطب‌های مغناطیسی زمین بر قطب‌های جغرافیایی زمین منطبق نمی‌باشند.


۱۳. دو آهنربای میله‌ای مشابه در کنار هم قرار داده شده‌اند. در کدام شکل خط‌های میدان مغناطیسی در فضای اطراف آن‌ها درست رسم شده‌اند؟



۱۴. در شکل مقابل شدت مغناطیسی N_۱ بزرگ‌تر از N_۲ است. خطوط میدان

مغناطیسی در کدام گزینه درست ترسیم شده است؟

(برگرفته از من کتاب درس)



از رابطه $\frac{1}{\tau} CV^{\tau} = U$ استفاده می‌کنیم و به یکاهای کمیت‌ها دقت می‌کنیم:

$$U = \frac{1}{\tau} CV^{\tau} \Rightarrow V / 2 \times 10^{-3} (J) = \frac{1}{\tau} \times 4 \times 10^{-6} \times V^{\tau} \Rightarrow V = 6V$$



یادآوری:

می‌توانیم از رابطه $\frac{1}{\tau} CV^{\tau} = U$ استفاده کنیم، اما پیش از آن یکاهای داده شده را باید مرتب کنیم:

$$P = \frac{U}{t} \Rightarrow U = P \times t$$

اگر یکای توان (P) وات و یکای زمان (t) ثانیه باشد، یکای انرژی (U) زول خواهد بود و در تبدیل یکای کیلووات ساعت (kWh) به زول می‌توان نوشت:

$$kWh \xrightarrow[h \times 3600 \rightarrow S]{kW \times 1 \rightarrow W} kWh \times (1000 \times 3600) = J$$

$$U = 10^{-9} (kWh) \times 3600 \times 1000 = 3.6J$$

در این سؤال می‌توان نوشت:

با توجه به این که ولتاژ خازن $V = 1kV = 10^3 V$ است داریم:

$$U = \frac{1}{\tau} CV^{\tau} \rightarrow 3.6 = \frac{1}{\tau} \times C \times (10^3)^{\tau} \Rightarrow C = 3.6 / 2 \times 10^{-9} (F) \Rightarrow C = 3.6 \mu F$$

چون تغییر انرژی خازن مورد نظر است می‌توان از رابطه‌های $U = \frac{1}{\tau} qV$ یا $U = \frac{1}{\tau} CV^{\tau}$ استفاده کرد، اما چون تغییر اختلاف

پتانسیل خازن داده شده است و با فرض این که ظرفیت خازن ثابت مانده است می‌توان از رابطه $U = \frac{1}{\tau} CV^{\tau}$ استفاده کرد و در دو حالت تغییر

$$U = \frac{1}{\tau} CV^{\tau} \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{C_2}{C_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\tau}$$

$$\frac{C_2 = C_1}{U_2 = U_1} \rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \left(\frac{V_2 - \Delta V_1 / 2 V_1}{V_1}\right)^{\tau} \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \left(\frac{100 - 96}{100}\right)^{\tau} \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = 0.4$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{4}{100} \Rightarrow \frac{U_2 - U_1}{U_1} = \frac{4 - 100}{100} \Rightarrow \frac{\Delta U}{U_1} = -\frac{96}{100} = -0.96$$

اما چون درصد تغییرات انرژی خازن مورد نظر است داریم:

چون تغییرات بار الکتریکی و همراه با آن نیز تغییرات انرژی خازن داده شده است می‌توان از رابطه $U = \frac{1}{\tau} \frac{q^{\tau}}{C}$ استفاده کرد و داریم:

$$U = \frac{1}{\tau} \frac{q^{\tau}}{C} \rightarrow \begin{cases} U_2 = \frac{1}{\tau} \frac{q_2^{\tau}}{C} \\ U_1 = \frac{1}{\tau} \frac{q_1^{\tau}}{C} \end{cases} \Rightarrow U_2 - U_1 = \frac{1}{\tau} (q_2^{\tau} - q_1^{\tau})$$

چون بار الکتریکی ۲۰ درصد افزایش یافته $q_2 = 1/2 q_1$ است یعنی:

$$q_2 = q_1 + 1/2 q_1 \rightarrow 16 (\mu J) = \frac{1}{\tau \times 2 \pi \mu F} ((1/2 q_1)^{\tau} - q_1^{\tau}) \Rightarrow 16 = \frac{1}{44} \times 0.44 q_1^{\tau} \Rightarrow q_1 = 40 \mu C$$

پاسخ را در دو مرحله بیان می‌کنیم. در مرحله اول کلید بسته است و خازن به باتری متصل و ولتاژ خازن ثابت است و چون فاصله بین دو

صفحه $2d$ افزایش یافته، این فاصله از $d_1 = d$ به $d_2 = 2d$ رسیده و ظرفیت خازن $\frac{1}{3}$ برابر می‌شود:

$$C = \kappa \epsilon_r \frac{A}{d} \rightarrow \frac{C_2}{C_1} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \times \frac{A_2}{A_1} \times \frac{d_1}{d_2} \xrightarrow[\kappa_2 = \kappa_1]{A_2 = A_1} \frac{C_2}{C_1} = \frac{d_1}{d_2} \xrightarrow[d_2 = 2d]{d_1 = d} \frac{C_2}{C_1} = \frac{1}{3}$$

و در این حالت برای مقایسه انرژی خازن از رابطه $\frac{1}{\tau} CV^{\tau} = U$ استفاده می‌کنیم یعنی:

$$U = \frac{1}{\tau} CV^{\tau} \rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{C_2}{C_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\tau} \xrightarrow[V_2 = V_1]{U_2 = U_1} \frac{U_2}{U_1} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{1}{3} \quad (1)$$

در حالت دوم کلید باز است، پس بار خازن ثابت می‌ماند و با ورود دیالکتریک به درون خازن $\kappa = 2$ ظرفیت آن ۲ برابر می‌شود:

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} = 2$$


فصل سوم

مغناطیس

ویژگی‌های مغناطیس و نیروهای مغناطیسی آن قدر مهم و پرکاربرد هستند که یک فصل از کتاب درسی را به خود اختصاص داده‌اند. مفاهیم اولیهٔ مغناطیس، میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی وارد بر بار متحرک و سیم حامل جریان، در قسمت‌های اولیهٔ این فصل مطرح شده است. این قسمت اندکی چاشنی مثلثات و نیاز به تجسم قوی بردارها در فضای سه‌بعدی دارد. در قسمت بعدی، آثار مغناطیسی ناشی از عبور جریان الکتریکی در سیم، پیچه و سیم‌لوله مطرح شده است. استفاده از قانون‌های دست راست برای تعیین جهت میدان مغناطیسی تولیدشده از جریان الکتریکی و تعیین نیروهای وارد بر ذره و سیم، در فضای سه‌بعدی، در درس‌های خودش را دارد. از این‌رو تلاش کرده‌ایم تا با ارائهٔ تست‌های متنوع و به تعداد کافی، شمارا کمی به زحمت بیندازیم تا در نهایت در کنکور در درس نداشته باشید. انتظار داریم از این فصل دو تست در کنکور مطرح شود.



۱۵. چنان‌چه شدت میدان مغناطیسی آهربای (۱) بزرگ‌تر از آهربای (۲) باشد، شکل خطوط میدان در کدام گزینه درست رسم شده است؟



(برگرفته از متن کتاب درس)

۱۶. در مورد کاربردهای میدان مغناطیسی کدام گزینه نادرست است؟

(۱) نانوذرهای مغناطیسی با پوشش خاص شیمیایی می‌توانند در کنترل سلول‌های سرطانی به کار روند.


(۲) یک نوع آهربای طبیعی به فرمول Fe_3O_4 وجود دارد.

(۳) میدان مغناطیسی حاصل از عضله‌های کوچک از مرتبه $T^{-12} \times 10^{-12}$ هستند.

(۴) مغناطیس سنج‌های بسیار حساس که میدان‌های مغناطیسی کوچک بدن را اندازه‌گیری می‌کنند، اسکویید نامیده می‌شوند.

۱۷. شکل خطوط میدان مغناطیسی در ناحیه‌ای از فضا رسم شده‌است. در کدام شکل اندازه و جهت بردار میدان درست ترسیم شده است؟

(برگرفته از متن کتاب درس)






نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

اگر ذره باردار متحرک خطوط میدان مغناطیسی را قطع کند، از طرف میدان بر آن نیروی وارد می‌شود ویزگی‌های این نیرو به شرح زیر است:

۱) نیروی وارد بر بار متحرک در میدان مغناطیسی، هم بر بردار سرعت (\vec{v}) و هم بر بردار میدان (\vec{B}) عمود است. (می‌توانیم بگوییم بر صفحه گذرنده از دو بردار \vec{v} و \vec{B} عمود است.)

۲) جهت نیروی وارد بر بار مثبت از قاعده دست راست تعیین می‌شود (جهت نیروی وارد بر بار منفی همواره خلاف جهت نیروی وارد بر بار مثبت است)، به این ترتیب که اگر چهار انگشت دست راست را به گونه‌ای درجهت حرکت بار قراردهیم که هنگام خم شدن انگشتان درجهت \vec{B} (میدان) قرار بگیرند، انگشت شست نشان‌دهنده جهت \vec{F} (نیرو) است یا می‌توانیم بگوییم \vec{v} (حرکت بار) در امتداد چهار انگشت دست راست بوده و \vec{B} (میدان مغناطیسی) از کف دست راست خارج شده و \vec{F} (نیروی مغناطیسی) در جهت شست دست راست است.



۳) وقتی بار درون میدان مغناطیسی یکنواختی در حال حرکت است اندازه نیروی مغناطیسی وارد بر آن از فرمول مقابل تعیین می‌شود:

$|F| = |q|vB\sin\theta$ منظور از $|q|$ اندازه بار الکتریکی، v تندی (اندازه سرعت)، B اندازه (شدت) میدان مغناطیسی و θ زاویه بین بردار \vec{v} با بردار \vec{B} است.

چون برای اولین بار در این فرمول B به کار رفته است، یکای میدان مغناطیسی از همین فرمول به دست می‌آید:

$$\text{میدان مغناطیسی} = \frac{N}{C \cdot \left(\frac{m}{s}\right)} = \frac{N}{A \cdot m}$$

که می‌دانیم $\frac{N}{A \cdot m}$ را تسلای (T) می‌نامند.

هم چنان‌که می‌دانید تسلای واحد بزرگی برای محاسبه شدت میدان است، واحد فرعی دیگری برای میدان وجود دارد بنام گاوس. $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$

بنایه تعریف داریم:

مثال: ذرهای با بار الکتریکی $C = -1 \text{ mC}$ در یک میدان مغناطیسی یکنواخت $T = \frac{1}{10} \text{ T}$ پرتاب می‌شود.


بزرگی و جهت نیروی مغناطیسی وارد بر ذره را به دست آورید.

پاسخ: با استفاده از رابطه $F = |q| v B \sin \theta$ می‌توان نوشت:


$$F = 1 \times 10^{-3} \times 10^2 \times \frac{1}{10} \times \sin 30^\circ \Rightarrow F = 0.5 \text{ N}$$

با استفاده از قاعده دست راست می‌توان دریافت نیروی مغناطیسی وارد بر ذره را به بیرون صفحه است.

۱۸. در شکل زیر کدام گزینه جهت نیروی الکترومغناطیسی بر بار مثبت در حال حرکت را درست نشان می‌دهد؟ (برگرفته از برسن کتاب درس)



۱۹. یک الکترون با سرعت v عمود بر میدان مغناطیسی B حرکت می‌کند و به آن نیروی F وارد می‌شود. کدام شکل وضعیت این سه بردار را درست نشان می‌دهد؟ (برگرفته از برسن کتاب درس)



۲۰. فرض کنید ذره بارداری در یک میدان مغناطیسی حرکت می‌کند. به چنین ذرهای یک نیروی مغناطیسی وارد می‌شود.

(۱) بردارهای نیرو و سرعت می‌توانند هر زاویه‌ای با هم داشته باشند.

(۲) بردارهای نیرو و میدان مغناطیسی می‌توانند هر زاویه‌ای با هم داشته باشند.

(۳) بردارهای سرعت و میدان مغناطیسی می‌توانند هر زاویه‌ای با هم داشته باشند.

(۴) هیچ یک از موارد بالا درست نیست.

۲۱. در یک مکان، میدان مغناطیسی یکنواخت و جهت آن رو به شمال است. اگر در این مکان ذرهای با بار الکتریکی مثبت و در راستای قائم رو به پایین پرتاب شود، نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی بر آن وارد می‌شود به کدام سمت خواهد شد؟ (برگرفته از برسن کتاب درس)

(۱) شمال (۲) جنوب (۳) مغرب (۴) شرق

۲۲. یک نقطه‌ای مثبت q در نقطه M قرار دارد. تا زمانی که بار q ساکن است، نیرویی به آن وارد نمی‌شود. هرگاه آن را در صفحه xy حرکت دهیم، به سمت چپ خود متحرف می‌شود. کدام گزینه در مورد میدان‌ها در نقطه M درست است؟ (از جرم ذره صرف نظر کنید). (برگرفته از برسن کتاب درس)

(۱) میدان مغناطیسی عمود بر صفحه شکل و به سمت داخل است.

(۲) میدان مغناطیسی عمود بر صفحه شکل و به سمت خارج است.

(۳) میدان مغناطیسی در جهت $-x$ است.

(۴) میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم وجود دارند.

۲۳. یک ذره کیهانی با بار مثبت از بالای خط استوا به طور عمود به سمت کره زمین در حرکت است. در آن لحظه، نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی زمین بر آن وارد می‌شود، به کدام جهت است؟ (برگرفته از برسن کتاب درس)

(۱) شرق (۲) غرب (۳) شمال (۴) جنوب

۲۴. میدان مغناطیسی زمین را افقی و رو به شمال فرض کنید. حال اگر در این میدان، یک الکترون در راستای قائم رو به بالا در حرکت باشد، نیرویی که از طرف میدان بر این الکترون وارد می‌شود، به کدام جهت است؟ (برگرفته از برسن کتاب درس)

(۱) جنوب (۲) شمال (۳) مغرب (۴) شرق

۲۵. اگر ذرهای با بار الکتریکی مثبت، با سرعت v مطابق شکل وارد میدان B شود، در چه راستا و جهتی به آن نیرو وارد می‌شود؟ (برگرفته از برسن کتاب درس)

(۱) عمود بر صفحه کاغذ و به سمت خارج
 (۲) در صفحه کاغذ و همسو با B
 (۳) در صفحه کاغذ و مخالف B



مهرونا



(2)

(3) هیچ کدام


(1)

(2)

(3) F

۲۶. در شکل زیر نیروی وارد به بار در کدام جهت است؟


- (1) تغییر نمی‌کند.
 (2) افزایش می‌باید.
 (3) کاهش می‌باید.



۲۷. ذره‌ای بازدار، با سرعت ۷ در راستای میدان مغناطیسی یکنواخت B و در خلاف جهت میدان وارد آن می‌شود. سرعت ذره تحت اثر میدان چگونه تغییر می‌کند؟




(اریاضی مدارج ۸۷)

۲۸. در شکل مقابل، الکترونی با سرعت ۷ در مسیری عمود بر میدان مغناطیسی در حرکت است. نیروی الکترومغناطیس وارد بر الکترون در یک لحظه نشان داده شده است. از آن لحظه، قسمتی از مسیر حرکت الکترون در میدان کدام است؟


۲۹. چنان‌چه بارهای الکتریکی نشان داده شده در شکل، با سرعت یکسان وارد منطقه میدان یکنواخت شده باشند، کدام گزینه درست است؟
 (برگرفته از پرسش کتاب درس)

- (1) $\frac{|q_2|}{m_2} > \frac{|q_1|}{m_1} > \frac{|q_3|}{m_3}$ همنام
 (2) $\frac{|q_2|}{m_2} > \frac{|q_3|}{m_3} > \frac{|q_1|}{m_1}$ همنام
 (3) $\frac{|q_3|}{m_3} < \frac{|q_1|}{m_1} < \frac{|q_2|}{m_2}$ همنام
 (4) $\frac{|q_3|}{m_3} < \frac{|q_2|}{m_2} < \frac{|q_1|}{m_1}$ همنام

۳۰. کدام شکل مسیر حرکت یک الکترون را که با سرعت اولیه ۷ وارد یک میدان مغناطیسی شده و هیچ نیروی دیگری به آن اثر نمی‌کند، نادرست نشان می‌دهد؟

۳۱. بار الکتریکی $+q$ در یک میدان مغناطیسی یکنواخت در حال چرخش است. اگر مسیر حرکت بار q مطابق شکل باشد، جهت میدان مغناطیسی کدام است؟
 (اریاضی ۸۱)

- (1) \rightarrow
 (2) \leftarrow
 (3) \odot
 (4) \otimes



پاسخ نامه‌ی تشریحی

۱ ۲ ۳ ۴

برای حل چنین تست‌هایی باید به چند اصل توجه کنید.

۱) ابتدا شکل خطوط میدان را رسم کنید، میدان در خارج آهنربا از قطب N به S و در درون آن از قطب S به N است.

۲) عقریه مغناطیسی یا بردار شدت میدان در هر نقطه مماس بر خطوط میدان و در جهت آن است.

حالا برویم سراغ تست خودمان:

در شکل، خطوط میدان را رسم کرده‌ایم و در نقاط معین شده، بردار مماس بر خطوط را ترسیم کردیم. فقط در نقطه B میدان درست نشان داده شده است.

۱ ۲ ۳ ۴

با توجه به وضعیت قرارگیری عقریه مغناطیسی، متوجه می‌شویم که سر Y آهنربا قطب S و درنتیجه سر X آهنربا قطب N است. حال با توجه به شکل خطوط میدان که در بیرون آهنربا از قطب N به قطب S است می‌توان نحوه قرارگیری عقریه مغناطیسی در نقاط A، B و C را تعیین کرد.

۱ ۲ ۳ ۴

برای حل چنین تست‌هایی باید به اصل زیر توجه کرد.

۱) ابتدا خط میدان را رسم کنید و در نقطه موردنظر، مماسی بر خط میدان و هم‌جهت با آن ترسیم کنید. چون نقطه M دقیقاً وسط N و S است، مماس در آن نقطه افقی بوده و جهت آن مطابق شکل به سمت راست است. عقریه مغناطیسی هم در امتداد همین خط و در همین جهت می‌ایستد به گونه‌ای که قطب N معرف جهت بردار است.


۱ ۲ ۳ ۴

کافی است به وضعیت عقریه مغناطیسی در نقاط مشخص شده توجه کنید (عقریه مغناطیسی در هر نقطه مماس بر خطوط میدان و در جهت آن قرار می‌گیرد). از نقطه (۱) تا (۲) عقربه 180° ، از (۲) تا (۳) 180° ، از (۳) تا (۴) 180° و در نهایت از (۴) تا (۱) 180° و در مجموع $4 \times 180^\circ = 720^\circ$ چرخیده است.


۱ ۲ ۳ ۴

حتماً با توجه به نکات گفته شده تا اینجا، تا اندازه‌ای قادر به تجسم خطوط میدان هستید. بد نیست با هم مروری بر شکل خطوط میدان داشته باشیم.


الف: آهنربای منفرد (نک)




در شکل، خطوط میدان را رسم کرده‌ایم و در نقاط معین شده، بردار مماس بر خطوط را ترسیم کردیم. فقط در نقطه B میدان درست نشان داده شده است.




با توجه به وضعیت قرارگیری عقریه مغناطیسی، متوجه می‌شویم که سر Y آهنربا قطب S و درنتیجه سر X آهنربا قطب N است. حال با توجه به شکل خطوط میدان که در بیرون آهنربا از قطب N به قطب S است می‌توان نحوه قرارگیری عقریه مغناطیسی در نقاط A، B و C را تعیین کرد.



۱) ابتدا خط میدان را رسم کنید و در نقطه موردنظر، مماسی بر خط میدان و هم‌جهت با آن ترسیم کنید. چون نقطه M دقیقاً وسط N و S است، مماس در آن نقطه افقی بوده و جهت آن مطابق شکل به سمت راست است. عقریه مغناطیسی هم در امتداد همین خط و در همین جهت می‌ایستد به گونه‌ای که قطب N معرف جهت بردار است.



کافی است به وضعیت عقریه مغناطیسی در نقاط مشخص شده توجه کنید (عقریه مغناطیسی در هر نقطه مماس بر خطوط میدان و در جهت آن قرار می‌گیرد). از نقطه (۱) تا (۲) عقربه 180° ، از (۲) تا (۳) 180° ، از (۳) تا (۴) 180° و در نهایت از (۴) تا (۱) 180° و در مجموع $4 \times 180^\circ = 720^\circ$ چرخیده است.




حتماً با توجه به نکات گفته شده تا اینجا، تا اندازه‌ای قادر به تجسم خطوط میدان هستید. بد نیست با هم مروری بر شکل خطوط میدان داشته باشیم.

الف: آهنربای منفرد (نک)

۶

- ۱) دو آهنگی مشابه که قطب‌های ناهم‌نام آن‌ها مقابل هم است.

۲) دو آهنگی مشابه که قطب‌های همنام آن‌ها مقابل هم است.



شکل خطوط میدان را رسم می‌کنیم، حتماً توجه دارید که قطب‌های هم نام هم‌دیگر را دفع می‌کنند و عقربه مغناطیسی یا بردار شدت میدان مماس به خطوط میدان و در جهت آن‌ها است.

The diagram shows a horizontal bar magnet with a North pole (N) on the left and a South pole (S) on the right. A vertical arrow labeled 'A' originates from the South pole (S) and points upwards, representing the magnetic dipole moment vector.

با توجه به درسنامه ارایه شده در تست های قبلی، P' و P حتماً باید ناهم نام باشند و جهت میدان از P' به سمت P باشد. پس P' قطب N و P قطب S است.

با دیدن دافعه مغناطیسی یک نتیجه می‌توان گرفت: حتماً دو سر نزدیک شده به هم، همنام هستند (قطب‌های مشابه) ولی با دیدن جاذبه مغناطیسی دو احتمال داریم: **الف**: دو سر نزدیک شده به هم ناهم‌نام هستند (قطب‌های نامشابه) ب: یکی از دو میله آهنربا و دیگری آهن (مادة فرومغناطیس است)

می‌رسیم به سؤال بسیار معروفی در مورد تشخیص قطب‌های آهنربا میله آهنی فاقد خاصیت مغناطیسی است. اما آهنربا دارای خاصیت مغناطیسی است که در دو سر آن این خاصیت بیشینه (یعنی قطب‌ها) و در وسط آن بسیار کوچک است. کافی است یکی از دو میله را به صورت افقی قرار داده و دیگری را در امتداد عمود منصف میله اول به آرامی به آن نزدیک کنیم. اگر:


الف: با نزدیک کردن B به A تپرویی دیده نشد (یا نیروی بسیار ضعیفی دیدیم) B میله آهنی و A آهنربا بوده است (وسط آهنربای میله‌ای خاصیت مغناطیسی چندانی ندارد).

ب: با نزدیک کردن B به A نیروی مغناطیسی رویت شده B آهربا است و A میله آهربا
بس توانستیم میله آهن و آهربا را تعیین کنیم ولی با این آزمایش نمی‌توان قطب‌های آهربا را
تشخیص داد.

۹- می‌دانیم خطوط میدان مغناطیسی بسته هستند و از طرفی این خطوط در بیرون آهربا از قطب N خارج شده و به قطب S وارد می‌شود و درون آهربا از S به سمت N است و همین دلیل بسته‌بودن خطوط است.

۱۰

می‌دانیم در اثر القای خاصیت مغناطیسی، سری از سوزنی که به قطب آهنربا چسبیده با آن ناهم‌نام و سر دیگر هم‌نام است.



۱۱

میدان یکنواخت، میدانی است که بردار میدان در تمام نقاط آن برابر باشد. میدان کمیتی است بوداری؛ وقتی می‌گوییم میدان در تمام نقاط یکسان است باید:

- ۱ جهت آن در تمام نقاط یکسان باشد \Leftarrow خطوط میدان خطوط مستقیم و با هم موازی باشند.
- ۲ اندازه آن در تمام نقاط یکسان باشد \Leftarrow فاصله خطوط میدان از هم (تراکم آن‌ها) یکسان باشد.

بنابراین میدان یکنواخت با خطوط موازی و هم‌فاصله معرفی می‌شود.

۱۲

زمین مثل یک آهنربای بزرگ است که قطب S آن در مجاورت شمال جغرافیایی زمین (نه دقیقاً بر روی آن) و قطب N هم در مجاورت جنوب جغرافیایی زمین قرار دارد (**گزینه ۱** غلط و **گزینه ۴** درست است).

می‌دانیم که امتداد مغناطیسی با امتداد شمال و جنوب جغرافیایی یکی نیست. به اختلاف این دو امتداد در هر نقطه زاویه میل گفته می‌شود (میل مغناطیسی).

میدان مغناطیسی زمین در بسیاری از نقاط، افقی (موازی سطح زمین) نیست. زاویه امتداد عقربه مغناطیسی با افق را در هر نقطه شبیه مغناطیسی می‌گویند.

بنابراین در **گزینه ۳ و ۶** دقیقاً میل و شبیه مغناطیسی جایه‌جا تعریف شده است.

۱۳

خطهای میدان مغناطیسی متقطع نمی‌باشند. نزدیک قطب‌ها تراکم آن‌ها بیشتر است و در خارج آهنربا از قطب N خارج به قطب S وارد می‌شوند. در آهنربای میله‌ای در دوسر آهنربا (قطب‌ها) خاصیت مغناطیسی بیشتر و در وسط آهنربا خاصیت مغناطیسی بسیار ضعیف است.

۱۴

راهبرد ۲

برای تشخیص وضعیت خطوط میدان، خوب است چند نکته را با هم مרוّر کنیم:



- ۱ خطوط میدان در بیرون آهنربا از قطب N خارج و به قطب S وارد می‌شود.
- ۲ هرچه میدان قوی‌تر باشد، تراکم خطوط میدان بیشتر است.

۳ اگر دو قطب هم‌نام روی‌هروی هم قرار گرفته باشند و شدت مغناطیسی آن‌ها با هم برابر باشد، دقیقاً در وسط دو قطب، میدان صفر است. اگر یکی از دو قطب ضعیفتر باشد، این نقطه (یعنی نقطه‌ای که میدان صفر است) به آن نزدیک‌تر خواهد بود.

۴ خاصیت مغناطیسی از آهنربا منتشر نمی‌شود. اگر شدت انتشار قطب یک آهنربا از قطب آهنربای دیگر قوی‌تر باشد، خطوط میدان آهنربای قوی‌تر روی خط میدان آهنربای ضعیفتر اثر می‌گذارد.

با این مقدمه به میدان دو آهنربای یکسان (هم‌شدت) و دو آهنربای غیریکسان (با شدت متفاوت) توجه کنید.

الف: دو آهنربای هم‌شدت (یکسان): محور تقارن، خطی است که درست در وسط فاصله دو قطب قرار گرفته و خطوط میدان کاملاً متقاضن است.




ب: دو آهنربای غیرهم‌شدت: نقطه‌ای که میدان در آن صفر است به آهنربای ضعیفتر نزدیک بوده و خطوط میدان آهنربای قوی‌تر، خطوط میدان آهنربای ضعیفتر را تحت اثر قرار داده و تعداد (تراکم) خطوط در نزدیکی آهنربای قوی‌تر بیشتر است.

با توجه به توضیحات بالا، خطوط میدان در **گزینه ۲** درست رسم شده است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰



توجه دارید که خطوط میدان از قطب N خارج شده و به قطب S وارد می‌شود
الف: اگر دو آهنربا هم‌شدت باشند، نقطه تغییر جهت (شکست) خطوط خارج شده از N، درست وسط دو آهنربا است.



ب: اگر شدت دو آهنربا یکسان نباشد نقطه تغییر جهت (شکست) به آهنربای ضعیفتر، نزدیک‌تر است و تعداد (تراکم) خطوط میدان رسم شده در کنار آهنربای قوی‌تر باید بیشتر باشد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

برای مطالعه دقیق‌تر باید نگاهی به فناوری و کاربردهای ذکر شده در کتاب داشته باشید.
گزینه ۱ گزینه ۲ و گزینه ۴ کاملاً از روی کتاب ذکر شده‌اند.

میدان مغناطیسی حاصل از عضله‌های کوچک در حدود $T = 10^{-10}$ (یک میلیونیم میدان مغناطیسی زمین) بوده و میدان مغناطیسی حاصل از عملکرد مغز در حدود $T = 10^{-12}$ است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰


بردار میدان در هر نقطه بر خطوط میدان مماس و هم‌جهت با آن است. هرچه تراکم خطوط میدان بیشتر باشد اندازه میدان و درنتیجه طول بردار معرف میدان در آن نقطه نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰


راهنمای ۳

راستا و جهت نیروی وارد به بار متحرک در میدان مغناطیسی را چگونه تعیین کنیم؟
باید از قاعدة تجربی دست راست استفاده کنیم. در این قانون توجه کنید که:

۱) خم انگشتان دست راست جهت چرخش $\vec{\tau}$ به سمت بردار \vec{B} را نشان می‌دهد
بعضی از بچه‌ها می‌پرسند حوب $\vec{\tau}$ را در هر دو جهت می‌توانیم بچرخانیم تا به \vec{B} برسد.
منظور زاویه کوچک‌تر بین این دو بردار است. در این صورت شست دست راست
معرف جهت و امتداد \vec{F} است.



۱) در مورد بارهای متحرک، چنان‌چه بار منفی باشد، باید جهت تعیین شده توسط قانون خم دست راست را برعکس (قرینه) کنید با از قانون دست چپ به همین شرح استفاده کنید.





۱) شرط وجود نیروی القابی این است که بردار سرعت بار متحرک، خطوط میدان مغناطیسی را قطع کند. اگر بردار سرعت بار متحرک با خطوط میدان موازی باشد به آن‌ها نیروی اثر نخواهد کرد.

۱) زاویه بین $\vec{\tau}$ با \vec{B} هر مقداری می‌تواند باشد ولی \vec{F} لزوماً بر هر دوی آن‌ها عمود است. به عبارت دیگر، باید بگوییم \vec{F} بر صفحه حامل $\vec{\tau}$ و \vec{B} عمود است. (می‌توان گفت \vec{F} بر صفحه‌ای که $\vec{\tau}$ و \vec{B} بر روی آن قرار می‌گیرند عمود است.)
روش نمایش بردارها در فضا:

در بحث تعیین نیروی القابی، متوجه شده‌اید که با توجه به این که \vec{F} بر صفحه $\vec{\tau}$ و \vec{B} عمود است، ناچاریم بردارها را در یک دستگاه ۳ بعدی نمایش دهیم. برای این کار دو روش معمول است:

۱) تجسم سه بعدی در صفحه: در این روش دستگاه x, y, z را در صفحه ترسیم و تجسم می‌کنیم (صرفًا تجسم است و گرنه می‌دانیم صفحه دو بعدی است). در این روش بایستی بردارها را همواره با محورهای اصلی مقایسه کرد.





میدان از قطب N به قطب S یعنی در جهت محور X‌ها و حرکت بار مثبت در امتداد محور Z‌ها است. در این صورت نیروی القابی به سمت بالا یعنی در جهت محور Z‌ها است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۳۲۲
۰۹
۰۸
۰۷
۰۶

میزوهاد




۱ در روش دوم صفحه را دو بعدی در نظر می گیریم. در این صورت اگر برداری عمود بر صفحه و به سمت خارج باشد، برونو سو و با نماد \otimes نمایش داده می شود و اگر عمود بر صفحه و به سمت داخل باشد درون سو و با نماد \otimes نمایش داده می شود.




۲ در تکمیل این نکته ها بد نیست به این موضوع هم اشاره شود که در بعضی از تستها به جهت های جغرافیایی اشاره می کنند در چنین مسائلی محورها عبارت خواهند بود از: $(\text{شمال} - \text{جنوب})$ و $(\text{شرق} - \text{غرب})$ و $(\text{بالا} - \text{پایین})$ که بر صفحه افق عمود است.


برایم سراغ حل تست: برای تسلط، در هر ۴ گزینه بردار نیرو را رسم می کنیم. به عبارتی با توجه به جهت \vec{V} و \vec{B} ، \vec{F} را تعیین می کنیم.




گزینه ۱:



گزینه ۲:



گزینه ۳:




گزینه ۴:


با مقایسه با گزینه ها، فقط جهت نیرو در گزینه ۴ درست نمایش داده شده است.

۱۹


روش اول: از قاعدة خم دست راست استفاده می کنیم و می بینیم که در کدام گزینه با توجه به جهت \vec{v} و \vec{B} ، \vec{F} درست ترسیم شده و حتماً دقت دارید که بار منفی است. یعنی پس از تعیین F با قانون دست راست باید جهت آن را قرینه کرد.




گزینه ۱:



گزینه ۴:



گزینه ۲:



گزینه ۳:



در گزینه ۳ جهت F درست داده شده است. اگر بار مثبت بود، سه گزینه دیگر درست بودند.
روش دوم: حل تست هم به این ترتیب است که چون بار متحرک منفی است، به جای قاعدة دست راست از قاعدة دست چپ استفاده می کنیم. (با همان شرح، یعنی خم انگشتان دست چپ، گردش \vec{v} به سمت \vec{B} و شست دست چپ نیروی مغناطیسی را نشان می دهد.)

۲۰

حتماً درس نامه را خوب خوانده اید ولی تکرار دوباره آن بی ضرر است! اگر به ذره باردار متحرکی یا سیم حامل جریانی در یک میدان مغناطیسی نیرویی اثر کند، این نیرو حتماً بر سرعت و میدان عمود است. ولی سرعت و میدان هر زاویه ای می توانند با هم بسازند.

۲۱

روش اول: با توجه به قاعدة دست راست و شکل مقابل نیروی وارد به بار مثبت به سمت شرق است.



روش دوم:

۲۲



جرم ذره ناچیز است، پس نیروی وزن به این ذره اثر نمی‌کند ($W = 0$). در حالت سکون نیروی مغناطیسی هم به ذره اثر نمی‌کند ($V = 0 \Rightarrow F = 0$).

چون در مثله ذکر شده در این حالت هیچ نیرویی به ذره اثر نمی‌کند، نباید در فضا میدان الکتریکی داشته باشیم ($E = 0$).

پس از حرکت ذره، به آن نیرویی به سمت چپ روی صفحه (xoy) اثر کرده، که حاصل وجود یک میدان مغناطیسی است. این میدان حتماً بر نیرو عمود است پس یا درون سو است یا برون سو. چون بار مثبت و انحراف به سمت چپ است (مثلاً در شکل مقابل)، با توجه به قاعدة دست راست، میدان باید درون سو باشد.

۲۳


می‌دانیم میدان مغناطیسی زمین رو به شمال و در استوا افقی است.



با توجه به قاعدة دست راست نیروی وارد به بار مثبت به سمت شرق است.

۲۴

توجه کنید که بار منفی است و پس از تعیین جهت اولیه F ، باید آن را قرینه کیم.



۲۵

طبق قاعدة دست راست جهت نیرو درون سو است، یعنی عمود بر صفحه به سمت داخل



۲۶

طبق رابطه $F = |q| vB\sin\theta$ چون بار به موازات میدان حرکت می‌کند ($\theta = 180^\circ = \pi$) نیرویی به بار وارد نمی‌شود.

۲۷

برای این که به بار متوجه از طرف میدان نیرویی وارد شود، باید بار متوجه خطوط میدان را قطع کند (نیاید با آن موازی حرکت کند). همچنان با توجه به فرمول نیرو می‌توانستید پگویید ($F = |q| vB\sin\theta$) اگر $\theta = 0^\circ$ باشد $\sin\theta = 0$ بوده و نیرویی به بار اثر نمی‌کند.


راهبرد ۴

مسیر انحراف بار متحرک در میدان مغناطیسی:

۱ اگر بار متحرک خطوط میدان مغناطیسی را قطع کند، مسیر حرکت آن حتماً قسمتی منحنی از یک منحنی (دایره) خواهد بود.

۲ در هر نقطه، بردار مماس بر مسیر، بردار سرعت در آن نقطه را نشان می‌دهد.

۳ در هر نقطه، بردار عمود بر مسیر به سمت داخل قوس (منحنی مسیر)، بردار نیرو یا شتاب را در آن نقطه نشان می‌دهد.




۴ با توجه به قاعدة دست راست برای (\vec{v} و \vec{B})، چنان‌چه نیرویی که به‌دست می‌آید با نیروی رسم شده (یعنی به سمت داخل منحنی مسیر) یکی باشد، بار مثبت و اگر برخلاف آن باشد، بار منفی است. در شکل بالا بار q_1 منفی و بار q_2 مثبت است.

۵ هرچه شعاع انحنای مسیر کمتر (کوچک‌تر) باشد، اثر نیرو (که از نظر ما شتاب حاصل از نیرو است) یعنی $\frac{F}{m}$ وارد به آن ذره بیشتر است. پس دقت کنید شعاع انحنای مسیر، اثر نیرو را نشان می‌دهد و نه خود نیرو. در مورد شکل بالا داریم:

$$\vec{B} \times \vec{v} = \vec{F}$$


$$R_2 < R_1 \Rightarrow \frac{F_2}{m_2} > \frac{F_1}{m_1}$$

با توجه به راهبرد مطالعه شده داریم:



۱ با توجه به جهت \vec{B} و \vec{F} ، بردار سرعت را به‌دست می‌آوریم. توجه کنید چون بار منفی است، \vec{v} به سمت بالا است. (با قانون دست راست \vec{v} به سمت پایین به‌دست می‌آید).

۲ مسیر انحراف را \vec{v} و \vec{F} تعیین می‌کند (\vec{F} باید به سمت داخل منحنی انحراف و \vec{v} بر آن مماس باشد).




۱ با توجه به قاعدة دست راست، q_1 بار مثبت، q_2 و q_3 بارهای منفی هستند (چون جهت انحراف آن‌ها، خلاف جهت نیرویی است که از قاعدة دست راست به‌دست می‌آید).

۲ هرچه شعاع انحنای مسیر کوچک‌تر باشد اثر نیرو ($\frac{F}{m}$) بزرگ‌تر است. با توجه به یکسان بودن v ، B و $\sin\theta$ داریم:

$$\begin{cases} F = |q| v B \sin \theta \\ \frac{F_2}{m_2} > \frac{F_1}{m_1} > \frac{F_3}{m_3} \end{cases} \Rightarrow \frac{|q_2|}{m_2} > \frac{|q_1|}{m_1} > \frac{|q_3|}{m_3}$$


توجه کنید که بار الکترون منفی است و پس از این که نیروی وارد بر بار را از قاعدة دست راست تعیین کردید، باید آن را وارون کنید.

گزینه ۱: انحراف باید به سمت پایین باشد. (درست است.)



گزینه ۲: چون بار در امتداد خطوط میدان حرکت کرده به آن نیرویی اثر نمی‌کند و منحرف نمی‌شود.

گزینه ۳: باید به سمت راست منحرف شود. (گزینه نادرست است.)



گزینه ۴: انحراف باید به سمت راست باشد. (گزینه درست است.)